

Studie	Indikation	Therapielinie	Therapie
GEPARDouze	Mammakarzinom triple negativ	neoadjuvant	neoadjuvant: Atezolizumab zu Paclitaxel /Carbo + AC dd.
Puma	Mammakarzinom HER2+	adjuvant	Niraparib, nach 1 Jahr trastuzumab
Impassion 050	Mammakarzinom Her2 positiv	neoadjuvant	neoadjuvant: Atezoltzumab + ddAC-PacHP vs. Placebo + ddAC - PacHP / adjuvant: Atezolizumab + Trastuzumab + Pertuzumab vs. Placebo + Trastuzumab + Pertuzumab
Ipatunity (Roche CO40016)	Mammakarzinom triple negativ	1 st line metastasiert	Paclitaxel +/- Ipatasertib (offen randomisiert)
OPAL	Mammakarzinom	1 st line metastasiert, lokal fortgeschritten und inoperabel	keine Vorgabe
RIBBIT	Mammakarzinom HR pos, HR2 neg,	1 st line viszeralmetastasiert	Ribociclib + Aromatase-Inhibitor /Fulvestrant vs. Capecitabin - Bevacizumab oder Paclitaxel mit /ohne Bevacizumab
DETECT III	Mammakarzinom HER2 negativ	1 st - 4 th line metastasiert	antineoplastische Therapie allein vs. Antineoplastische Therapie + Lapatinib
IRENE	Mammakarzinom	1 st - 3 rd line metastasiert oder lokal fortgeschritten	Eribulin - Therapie
PreCycle	Mammakarzinom HR pos, HER2 neg.,	1 st line bis max. ≤ 3 rd line metastasiert, lokal fortgeschritten und inoperabel (max. 1 CTx und/oder 2HTx)	Palbociclib + Aromataseinhibitor oder Palbociclib + Fulvestrant